Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 19:30

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/granulat-na-myszy-i-szczury-100g-bros-p-10436.html



Granulat na myszy i szczury 100g BROS

Cena	**4,73 zł**
Numer katalogowy	**1116101041**
Kod producenta	**5904517329232**
Kod EAN	**5904517329232**
Producent	**Bros**

Opis produktu

Granulat na myszy i szczury BROS 100g

Trutka jest atrakcyjna dla gryzoni ze względu na odpowiednią wielkość i twardość granulatu oraz specjalne dodatki smakowe. Granulki zawierają tylko substancje pokarmowe bez stosowanych w innych trutkach wypełniaczy.

Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Firma **BROS** to wiodący producent najwyższej jakości preparatów przeciwko małym intruzom w domu i ogrodzie, które cechuje bardzo wysoka skuteczność i długotrwałe działanie. Produkty produkowane są z wyselekcjonowanych składników. Zastosowanie najnowszych dostępnych technologii, gwarantuje wygodne i bezpieczne korzystanie.

- **Cechy główne:** Skuteczność w 1 dawce, Z aromatem zboża, Właściwości mumifikujące
- **Waga Jednostkowa (g):** 100
- **Rodzaj Pojemnika:** Saszetka
- **Forma:** Granulat
- **Zastosowanie:** Przeciwko myszom, Przeciwko szczurom

BROS granulat na myszy i szczury I

Przynęta gotowa do użycia. **Granulat** do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz szczurów wokół budynków. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Posiada właściwości mumifikujące i zawiera barwnik oraz gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do spożycia. Wyjątkowo atrakcyjny dla gryzoni dzięki aromatowi zboża. **Sposób użycia:** Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni: ścieżki wędrówek, nory, miejsca gniażdżenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych. Przynętę umieścić w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed zalaniem, niepożądanym otwarciem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur (nie należy wyjmować przynęty z saszetki). **Mysz domowa:** stosować 60 g. **Szczur wędrowny:** stosować 100 g. Jeżeli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna: w przypadku wysokiej infestacji (dużej ilości gryzoni na danym terenie) stosować min. co 5 m, w przypadku niskiej infestacji stosować min. co 10 m. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania, przynajmniej: myszy co 2 - 3 dni, szczurów co 5 - 7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu: określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać zjedzoną przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną, wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie stosując rękawice ochronne lub narzędzia np. szczypce. W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni). Przed zastosowaniem należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży oraz rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno itp). Przed zastosowaniem nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty. **Pierwsza pomoc:** Kontakt ze skórą: spłukać skórę wodą, a następnie umyć wodą i mydłem. Kontakt z oczami: wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli dotyczy, przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, a następnie utrzymać powieki otwarte przez co najmniej 10 minut. Kontakt z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Antidotum: witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny / weterynaryjny. Skutki uboczne / działania niepożądane: produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu. Stacje deratyzacyjne należy oznakować zgodnie z zaleceniami. Oznakowania muszą zawierać następujące informacje: "Nie przenosić ani nie otwierać"; "Zawiera substancję gryzoniobójczą"; "Nazwa produktu lub nr pozwolenia"; "Substancja czynna" i "W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (Gdańsk (58) 682 04 04, Kraków (12) 411 99 99, Poznań (61) 847 69 46, Warszawa 607 218 174)". **Środki ochrony środowiska:** W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt. Opakowania po produkcie, pozostałości produktu (w tym przynętę znalezioną poza stacją deratyzacyjną), zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz padłe gryzonie, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Chronić przed światłem. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej. **Substancja czynna:** bromadiolon 0,0029 g/100 g związek z grupy antykoagulantów. Nr pozwolenia: PL/2017/0237/MR. Do stosowania przez użytkowników powszechnych. **Środki ostrożności:** Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Nie stosować w pobliżu żywności, napojów, pasz, przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce wodą z mydłem. Nie umieszczać stacji w pobliżu miejsc, w których mogą mieć kontakt z wodami powierzchniowymi. Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji lub wykrycia ich aktywności). Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Ze względu na mechanizm działania substancji aktywnej skutki zastosowania produktów można zaobserwować (gryzonie giną) po upływie 4 - 10 dni po spożyciu przynęty. Gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy powiadomić dostawcę / sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znalezioną poza stacjami.

LAM791

Uwaga H373 Może powodować uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P260 Nie wdychać pyłu. P280 Stosować rękawice ochronne. P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.





Data ważności i nr serii na opakowaniu.

UFI: 5W3P-R0V7-200K-N6TS

Podmiot odpowiedzialny: BROS sp. z o.o., ul. Karpia 24 61-619 Poznań, tel. 61 826 25 12, e-mail: biuro@bros.pl

www.bros.pl

Ilość produktu w opakowaniu:

100 g