Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 19:31

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/granulat-na-myszy-i-szczury-1kg-5x200-g-doypack-p-10442.html



Granulat na myszy i szczury 1kg (5x200 g) doypack

Cena	**42,32 zł**
Numer katalogowy	**1116101052**
Kod EAN	**5904517336391**
Producent	**Bros**

Opis produktu

Granulat na myszy i szczury, 1 kg (5x200 g) - Bros

Zidentyfikowałeś w domu skupiska myszy lub szczurów?

W tej walce nie jesteś bezbronny! Działaj szybko zanim zadomowią się u Ciebie na stałe!

- Opakowanie **1 kg (5x200 g).**
- Preparat **na gryzonie do stosowania wewnątrz i wokół budynków.**
- **Skuteczny już po jednokrotnym spożyciu.**
- **Atrakcyjny** dla gryzoni **dzięki aromatowi zboża.**
- **Zawiera gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do jego spożycia.**
- Posiada **właściwości mumifikujące.**

Zastosuj **granulat na myszy i szczury od Bros. Preparat** jest **atrakcyjny dla gryzoni** ze względu na o**dpowiednią wielkość i twardość granulatu oraz specjalne dodatki smakowe.** Granulki zawierają **tylko substancje pokarmowe bez stosowanych w innych trutkach wypełniaczy.**

Pamiętaj! Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Nie czekaj aż myszy i szczury zadomowią się na dobre! Działaj szybko.

BROS

BROS granulat na myszy i szczury II

Przynęta gotowa do użycia. **Granulat** do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz wokół budynków. Do stosowania wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Posiada właściwości mumifikujące, zawiera gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do spożycia oraz barwnik. Wyjątkowo atrakcyjny dla gryzoni dzięki aromatowi zboża.

Sposób użycia: Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni: ścieżki wędrówek, nory, miejsca gniażdżenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych itp. Przynęty nie należy wyjmować z saszetek – jeżeli dotyczy. Przynętę umieścić w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem itp.), zalaniem, niepożądanym otwarciem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur. **Mysz domowa:** stosować 60 g – 100 g na stację deratyzacyjną. **Szczur wędrowny:** stosować 100 g – 200 g na stację deratyzacyjną. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania, przynajmniej: myszy co 2 – 3 dni, szczurów co 5 – 7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać zjedzoną przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną, regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie stosując rękawice ochronne (PVC / nitrylowe) lub narzędzia np. szczypce. Gryzonie mogą przenosić choroby! W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów) oraz usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni np. rozsypanego ziarna itp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub przekazanych w punkcie sprzedaży oraz rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dot. zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), obejmujących dobrą praktykę higieniczną oraz fizyczne metody zwalczania. Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie, należy rozważyć przeniesienie stacji w inne miejsce lub zmianę postaci użytkowej produktu. Przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, w celu identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności i danych dot. infestacji. Przed zastosowaniem nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.



Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 Powoduje uszkodzenie narządów (krwi) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P260 Nie wdychać pyłu. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne (PVC / nitrylowe). P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady i zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość i pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Miejsca publiczne, w których wyłożono produkty powinny być oznakowane informacją o rozpoczęciu deratyzacji oraz ostrzeżeniem, że kontakt z produktem lub martwymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacją o środkach pierwszej pomocy. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Nie stosować w pobliżu żywności, napojów, pasz, przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą. Nie czyścić wodą stacji deratyzacyjnych w trakcie zabiegu deratyzacji ani innych materiałów mających kontakt z przynętą. Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji lub wykrycia ich aktywności). Zabezpieczyć przynętę przed wymoczeniem i kontaktem z wodą. W celu zmniejszenia pylenia produktu, wykładać przynętę za pomocą miarki. Metody ograniczające pylenie produktu: wycieranie na mokro. Nie stosować produktu do nor gryzoni. Ze względu na mechanizm działania substancji aktywnej skutki zastosowania produktu można zaobserwować (gryzonie giną) po upływie 4 – 10 dni po spożyciu przynęty. Gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę, powiadomić dostawcę i sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją, a w razie podejrzenia oporności zmienić substancję czynną na substancję z innej grupy rodentycydów lub zastosować inne metody zwalczania. Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znajdującą poza stacjami.

Pierwsza pomoc: Kontakt ze skórą: spłukać skórę wodą, następnie umyć wodą z mydłem. Kontakt z oczami: wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli dotyczy, przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, a następnie otrzymać powieki otwarte przez co najmniej 10 minut. Kontakt z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust nieprzytomnej osobie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Antidotum: witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny / weterynaryjny. Skutki uboczne i działania niepożądane: produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu. Stacje deratyzacyjne należy oznakować zgodnie z zaleceniami. Oznakowania muszą zawierać następujące informacje: "Nie przenosić ani nie stawiać"; "Zawiera substancję gryzoniobójczą"; "Nazwa produktu lub nr pozwolenia"; "Substancja czynna" i "W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć: Gdańsk 58 682 04 04, Kraków 12 411 99 99, Poznań 61 847 69 46, Warszawa 607 218 174".

Środki ochrony środowiska: W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać go firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalanie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt. Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu (w tym przynętę znalezioną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz padłe gryzonie, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci, ptaków oraz innych zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. Chronić przed światłem. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Substancja czynna: bromadiolon 0,0050 g/100 g związek z grupy antykoagulantów.

Nr pozwolenia: PL/2018/0312/MR. Do stosowania jedynie przez użytkowników profesjonalnych.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.

KZ1264

Podmiot odpowiedzialny:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

UFI: 5JT5-C0CW-U00C-X2PA

PAP

Masa pojedynczej porcji: **200 g**

Ilość produktu w opakowaniu: **1 kg**

5904517336391