Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.agrozam.pl/bros-trutka-platkil-na-myszy-1kg-5x200g-doypack-p-10443.html



BROS Trutka PŁATKIL na myszy 1kg 5x200g doypack

Cena	**42,32 zł**
Numer katalogowy	**1116101053**
Kod EAN	**5904517336414**
Producent	**Bros**

Opis produktu

BROS Trutka płatkil na myszy i szczury 1kg (5x200g doypack - saszetka)

Gotowy do użycia preparat gryzoniobójczy sporządzony na bazie naturalnej mieszanki zbożowej. Trutka polecana szczególnie w zwalczaniu myszy. Posiada właściwości mumifikujące i dodatek zabezpieczający przed przypadkowym spożyciem przez ludzi i zwierzęta domowe. Produkt przeznaczony dla użytkownika powszechnego pakowany jest w praktyczne saszetki, które umożliwiają aplikację trutki bez jej dotykania. Ponadto takie rozwiązanie sprawia, że zapachy z zewnątrz nie są przenoszone na trutkę, dzięki czemu jest ona bardziej atrakcyjna dla gryzoni. Dodatkowo saszetka chroni przed rozsypywaniem się produktu i ogranicza dostęp do niego dzieciom i zwierzętom domowym.

PARAMETRY:

- **na bazie mieszanki zbożowej;**
- skuteczność po 1 dawce**;**
- **właściwości mumifikujące;**
- Trutka w swoim składzie zawiera **wyjątkowo mocny środek** bromadiolon
- Kolor - **czerwony**
- zawiera **BITREX** substancję **o gorzkim smaku**, która zapobiega przypadkowemu połknięciu produktu przez dzieci.
- opakowanie: 5x 200g (1kg trutki)

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni: ścieżki wędrówek, nory, miejsca gnieżdżenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych itp.

Trutkę najlepiej aplikować w specjalnych karmnikach lub stacjach deratyzacyjnych.

BROS

PLATKIL na myszy i szczury II

Platkil do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków. Do stosowania wyłącznie w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych. Przynęta gotowa do użycia (ziarno). Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Posiada właściwości mumifikujące i gorzką substancję zniechęcającą ludzi i zwierzęta domowe do spożycia oraz barwnik. Wyjątkowo atrakcyjne dla gryzoni dzięki wykorzystaniu specjalnie dobranych, całych ziaren zbóż.

Sposób użycia: Stosować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc występowania gryzoni: ścieżki wędrówek, nory, miejsca gnieżdżenia się, otwory, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych itp. Przynęty nie należy wyjmować z saszetek (jeżeli dotyczy). Przynętę umieścić w stacjach deratyzacyjnych, zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem itp.), zalaniem, niepożądanym otwarciem i tam gdzie to możliwe przytwierdzonych do podłoża lub innych struktur. **Mysz domowa:** stosować 60 g – 100 g na stację deratyzacyjną. **Szczur wędrowny:** stosować 100 g – 200 g na stację deratyzacyjną. Należy prowadzić regularne inspekcje stacji deratyzacyjnych (na początku okresu zwalczania, przynajmniej: myszy co 2 – 3 dni, szczurów co 5 – 7 dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu określenia skuteczności produktu, oceny stanu stacji deratyzacyjnych oraz usunięcia padłych gryzoni. Należy uzupełniać zjedzoną przynętę, wymieniać tę uszkodzoną przez wodę i zanieczyszczoną, regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie stosując rękawice ochronne (PVC / nitrylowe) lub narzędzia np. szczypce. Gryzonie mogą przenosić choroby! W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji, należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów) oraz usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni np. rozsypanego ziarna itp. Przed zastosowaniem należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub przekazanych w punkcie sprzedaży oraz rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek). Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dot. zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), obejmujących dobrą praktykę higieniczną oraz fizyczne metody zwalczania. Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie, należy rozważyć przeniesienie stacji w inne miejsce lub zmianę postaci użytkowej produktu. Przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, w celu identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności i danych dot. infestacji. Przed zastosowaniem nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.



Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 Powoduje uszkodzenie narządów (krew) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. P101 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P260 Nie wdychać pyłu. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne (PVC / nitrylowe). P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. Miejsca publiczne, w których wykładano produkty powinny być oznakowane informacją o rozpoczęciu deratyzacji oraz ostrzeżeniem, że kontakt z produktem lub martwymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o środkach pierwszej pomocy. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Nie stosować w pobliżu żywności, napojów, pasz, przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, rowów nawadniających lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą. Nie czyścić wodą stacji deratyzacyjnych w trakcie zabiegu deratyzacji ani innych materiałów mających kontakt z przynętą. Nie należy stosować produktu w zabiegach z przynętą wykładaną w sposób ciągły (np. w celu zapobiegania infestacji lub wykrycia ich aktywności). Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem i kontaktem z wodą. W celu zmniejszenia pylenia produktu, wykładać przynętę za pomocą miarki. Metody ograniczające pylenie produktu: wyciemnienie na mokro. Nie stosować produktu do nor gryzoni. Ze względu na mechanizm działania substancji aktywnej skutki zastosowania produktu można zaobserwować (gryzonie giną) po upływie 4 – 10 dni po spożyciu przynęty. Gryzonie powinny zostać zwalczone w ciągu 35 dni. Jeśli po tym okresie aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę, powiadomić dostawcę / sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się deratyzacją, a w razie podejrzenia oporności zmienić substancję czynną na substancję z innej grupy rodentycydów lub zastosować inne metody zwalczania. Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć stacje deratyzacyjne oraz przynętę znalezioną poza stacjami.

Pierwsza pomoc: Kontakt ze skórą: spłukać skórę wodą, następnie umyć wodą z mydłem. Kontakt z oczami: wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli dotyczy, przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczu lub wodą, a następnie utrzymać powieki otwarte przez co najmniej 10 minut. Kontakt z jamą ustną: ostrożnie przepłukać jamę ustną wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust nieprzytomnej osobie. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę. W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Antidotum: witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny i weterynaryjny. Skutki uboczne / działania niepożądane: produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu. Stacje deratyzacyjne należy oznakować zgodnie z zaleceniami. Oznakowania muszą zawierać następującą informację: "Nie przenosić ani nie otwierać"; "Zawiera substancję gryzoniobójczą"; "Nazwa produktu lub nr pozwolenia"; "Substancja czynna" i "W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć Gdańsk 58 682 04 04, Wrocław 12 411 99 99, Poznań 61 847 69 46, Warszawa 607 288 174".

Środki ochrony środowiska: W przypadku niezamierzonego uwolnienia produktu do środowiska, należy go zebrać (mechanicznie) unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą i przekazać go firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarnie). Produkt niebezpieczny dla dzikich zwierząt. Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem, pozostałości produktu (w tym przynętę znalezioną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz padłe gryzonie, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci, ptaków oraz innych zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. Chronić przed światłem. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Substancja czynna: bromadiolon 0,005) g/100 g związek z grupy antykoagulantów.

Nr pozwolenia: PL/2017/2511/MR. Do stosowania jedynie przez użytkowników profesjonalnych.

Data ważności i nr serii na opakowaniu.

KZU66

Podmiot odpowiedzialny:
BROS sp. z o.o.
ul. Karpia 24, 61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

PAP

UFI: 5JV5-0081-V00Q-5X2T

Masa pojedynczej porcji: **200 g**

Ilość produktu w opakowaniu: **1 kg**

5 904517 336414 >